

SORTIE SHNVC+ SMMVS

29 membres des 2 associations

13/09/26

112 espèces

BOIS BARBU --VILLARDS DE LANS

GPS 45.056066 , 5.52034338250 - Altitude : 1140 m

14/09/26

index fungorum

GENRE	ESPECE	COMMENTAIRES DES MYCOLOGUES
BOLETALES = 10		
Boletus	reticulatus	cèpe de l'été
Butyriboletus	appendiculatus	réseau jaune sur fon jaune – chair à odeur de viande ou noix fraîche
Chaciporus	piperatus	base du stipe jaune fluo et piquant
Chroogomphus	Viscidus = rutilus	en forme de clou – cuticule visqueuse
Gomphidius	glutinosus	chair blanche et base du stipe jaune
Hygrophoropsis	aurantiaca	fausse girofle à lames bifides (comme les serpents)
Leccinum	albofistulatum	chapeau orangé – squames du stipe claires
Leccinum	scabrum	chair immuable
Neoboletus	erythropus	points rouge sur le stipe
Suillellus	luridus	bolet à réseau rouge sur fond jaune – Ligne de Bataille

RUSSULLALES = 29		
Lactarius	acris	gris à ocre, visqueux, amer, lait blanc rosissant sur l'ongle, hêtres, terrain calcaire
Lactarius	blennius f viridis	sous fagus – chapeau verdâtre et guttulé
Lactarius	britannicus f pseudofulvissimus	latex jaunît sur le mouchoir (15 mn)
Lactarius	chrysorrheus	
Lactarius	deterimus	stipe lisse – verdit de partout
Lactarius	intermedius	chapeau zoné jaune clair et lisse au milieu (mettre le doigt!)
Lactarius	salmonicolor	stipe à fossettes – pas de vert
Lactifluus	volemus	aspect plastique et latex abondant
Russula	adusta	grosse claire, rougit faiblement, od vieux bouchon/tonneau , pd cabossé, chp gras et lames espacées, douce
Russula	amethystina	cocarde violette – L jaune – stipe blanc odeur de salière !!
Russula	anthracina	noircit sans rougir, Lames non roses, serrées, âcres non mentholées
Russula	aurea	lames jaune surtout vers la marge – chp rouge et jaune
Russula	chloroides	Lames plus étroites que chair du chapeau
Russula	cyanoxantha f.peltata	lames grasses fe vert pâle
Russula	delica ?	<i>grosse espèce à forte odeur de hareng</i>
Russula	exalbicans	Doux > âcre stipe creux jaunissant+fe= jaune vert Gaiac= L1P0 spores C2
Russula	fellea	odeur de compote de pomme
Russula	firma	spores A2 B2
Russula	integra	chap brun – saveur de noisette – stipe ferme
Russula	integra var oreas	Centre jaune - beaucoup de forme blanche à 90 %
Russula	integra var pseudo-olivascens	presque toute verte
Russula	integra var purpurella	toute pourpre
Russula	langei	pied ferme lavé de rose/violet, Fe2SO4 non nul (contrairement à cyanoxantha), gaiac
Russula	lepida	cuticule sèche, saveur mentholée
Russula	olivacea	lames gercées – stipe rose joufflu (gros)
Russula	queletii	entièrement pourpre rose – lames âcres jaune – odeur pommes+confiture
Russula	sanguinaria	sous conifères pas obligatoirement / pins
Russula	subfoetens	KOH jaune chrome > brun
Russula	foetens ?	<i>KOH nul et grosse espèce</i>
Russula	violeipes f.citrina	Chp jaune citrin, pied blanc

LEUCOSPOREE = 24		
Amanita	coryli	vaginée avec stipe blanc non chiné volve blanche avec spot orange
Amanita	excelsa var excelsa	anneau strié + stipe plus haut que diam chap
Amanita	muscaria	
Amanita	phalloides	volve en sac – anneau lisse
Amanita	rubescens	anneau strié et pied et verrues comme arrosé de gouttes de vin
Amanita	rubescens f annulosulphurea	idem avec anneau jaune
Clitocybe	ditopus ou foetens ?	<i>indéterminée</i>
Clitocybula	platyphylla	très larges les lames !! très fibreux le pied
Collybiopsis	confluens	Collybie en groupe – stipe poilu finement
Collybiopsis	peronata	lames jaune de buis – odeur vinaigrée – saveur poivrée
Echinoderma	echinaceum ?	<i>lépote à chapeau d'écaillés pyramidales</i>
Hygrophorus	erubescens	amère même à la base du stipe # var erubescens doux et sans jaune
Hymenopellis	radicata f marginata	chapeau glutineux – stipe radicaux – arête margées de brun
Infundibulycibe	gibba	en entonnoir – odeur de coumarine
Lentinellus	micheneri	L décurentes et crénelées – amère – pas de clamydospores 5 X 3,5
Lepiota	cristata	petite lépote à odeur de caoutchouc+mandarine
Leucocybe	connata	entièrement blanc – odeur de petit pois
Macrolepiota	procera	stipe chiné

Mucidula	mucida	entierement blanc et visqueux – sur bois (Fagus)
Mycena	leptocephala	7,5 x 3,8 basides à 4 spores Q 1,9 odeur presque alcaline
Mycena	pelianthina	arête des lames violet sombre
Mycena	romagnesiana	pris pour un hydropus sur le table
Mycetinis	alliaceus	stipe noir et odeur forte
Rhodocollybia	maculata	stipe blanc raide et tâché de roux comme le chapeau

RHODOSPOREE = 3

Laccaria	proxima	Plus robuste que laccata, pied rigide, chp avec squames
Pluteus	romellii	chap brun – lames roses – stipe jaune – lignicole
Pluteus	atromarginatus =tricuspidatus	arête des lames noires, sur bois mort de conifères, cystides à crochet, boucles

OCHROSPOREE = 7

Calonarius	dibaphus	belles couleurs sur ce bulbopodium avec KOH= rose dentifrice !
Cortinarius	nanceiensis	cortinaire jaune à cortine abondante et odeur de pâtisserie
Gymnopilus	penetrans	sur bois, jaune concolore mais sporée brune – petit anneau
Hebeloma	mesophaeum	L café au lait – apex brun foncé
Hebeloma	sp	perdu
Kuehneromyces	mutabilis	chaussette et bel anneau
Pseudosperma	rimosum	chapeau pointu – Lames verdâtres

MELANOSPOREE =2


Coprinus	comatus	Chevelu !!
Hypholoma	fasciculare	lames verdâtres – sporée sombre

AUTRES = 37

Albatrellus	citrinus	blc jaunît KOH jaune à brun /SO4Fe gris-vert, sp IKI, épicéas
Apioperdon	pyriformis	en forme de poire, sur bois, le seul lycoperdon à spores lisses
Bjerkandera	adusta	hyménium gris
Calocera	viscosa	jaune
Cantharellus	amethysteus	restes de squames violettes sur le chapeau
Cerioporus	leptocephalus	petit, base du pied noire, pores décurrents, sur bois, Ø > 2,5 cm
Clavariadelphus	pistillaris	en forme de massue, hêtre surtout, amer
Climacocystis	borealis	hyménium blanc – marge jaunâtre
Craterellus	tubaeformis	elles ont soif
Cyathus	striatus	gastéromycète en forme de nid
Diatrype	disciformis	pyrénomycète en tâches noires sur bois de hêtre
Ditiola	pezizaeformis	
Fomitopsis	pinicola	marge orange
Fuscopostia	fragilis	polypore mou et blanc rougit> brunit au toucher
Gloeophyllum	odorum	sur souche, odeur de pain d'épices
Gloiothele	citrinus	spores amyloïdes
Guepinia	helvelloides	la vie en rose et en cornet !!
Helvella	crispa	Stipe lacuneux blanc
Heterobasidion	annosum	
Hyphodontia	alutaria	
Lycoperdon	perlatus	perlé
Phaeolus	schweinitzii	hyménium poré jaune verdâtre – parasite des racines de pin
Phragmotrichum	chailletii	apothécie de 0,5 mm sur cônes d'épicéa
Picipes	melanotus	Grosse espèce pores fins – stipe noir
Polyporus	tuberaster	stipe central
Postia	fragilis	blanc, rougit brunit, conifères
Pseudohydnum	gelatinosum	aiguillons bleu transparents et mous
Pyrrhulomyces	astragalinus	jaune de partout mais chapeau orange abricot – lignicole
Ramaria	aurea	gaiac bleu en < 1 m # flava 5 mn
Ramaria	pallida	Gaiac = 0 pale, tronc, ramifications en V, od café au lait ou de chicorée (fenugrec en vieillissant)
Sarcodon	imbricatum	« Aile de bécasse » Ecaïlles dressées/fond beige KOH-, B+ doux calcaire epiceas
Spathularia	flavida	Jaune !! en raquettes, jaune vif, conifères
Trametes	gibbosa	pores + allongées, +épais, surface poilue
Trametes	versicolor	marge blanche
Trichaptum	abietinum	hyménium violet
Tricholomopsis	decora	écaïlles verdâtres
Tyromyces	chioneus	polypore mou et blanc immuable au toucher



Diatrype disciformis spores allantoides (saucisse)



Gloiothele citrinus



Hyphodontia alutaria



Amanite phalloide
dose mortelle 30 g pour 70 kg



Hygrophorus erubescens - saveur amère et lames peu larges



Calonarius dibaphus se reconnaît avec sa réaction couleur rose dentifrice à la soude




Russula olivacea
cuticule gercée – stipe rose jouflu (gros)
russule dont la toxicité à été discredité par le Dr Sitta
Donc à placer dans à rejeter simplement



Russula antracina
noircit sans rougir, Lames non roses, serrées, âcres non mentholées



Russula sanguinaria
âcre souvent sous les pins
mais aussi sous les autres conifères
Cuticule avec piléocystides



Russula exalbicans
stipe mou et sans réaction au Gaiac
spore B2



Russula integra var oreas
bonne russule à saveur de noisette
Il existe 3 formes et plusieurs variété



Ramaria aurea
réaction au gaiac ici 30 secondes moins de 2 mn

Ramaria flava en 5 mn
Ramaria formosa 15 mn
Ramaria pallida = 0
Ramaria bataillei = bleu immédiat



Lactarius intermedius
fossettes sur le stipe - Latex blanc > jaune

Listing :

Hélène Dusmenyl
Eric Michon

Images :

Eric Michon
Hélène Dusmenyl
Jean-Luc Mainardi
Michel Chemarin † (R exalbicans)

Microscopie imagerie

Hélène Dusmenyl
Eric Michon



A notre ami Jeannot...

JEAN MASSOL
1941-2026