

**Tableau comparatif - Les orchidacées - Inflorescence en fuseau + ou - cylindrique - Couleur rose à rouge**

Nom scientifique	Nom commun	Altitude (m)	Biotope	Fleurit	Tige H = (cm)	Feuilles	Inflorescence	Sépales Pétales	Labelle	Eperon	Observations
<i>Traunsteinera globosa</i>	Orchis globuleux	montagne 900 à 2600	Pleine lumière. Sols calcaires frais à humides. Pacages, prairies de fauche	fin 05 à fin 08	élancée flexueuse 20-60	Sans rosette basale. Caulinaires vert glauque, dressées, entourant la tige	<b>Globuleuse.</b> Nombreuses petites fl. Roses.	Réunis en un casque ouvert. Se terminent par <b>pointe spatulée</b>	Nettement trilobé. Nombreux points rouges à pourpre	Fin et court. // à l'ovaire	
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Orchis moucheron	< 2400	Milieux très variés. Surtout calcaire. Pelouses sèches, prairies humides, suintements, marais, bois clairs	déb 05 à fin 08	port grêle à robuste 15-60	F + ou - distiques (disposées sur 2 rangées verticales situées sur un même plan)	Epi cylindrique étroit. 20 à 60 petites fl rose à rose violacé. <b>Forte odeur agréable.</b>	Sépales ovales, obtus, à bords enroulés. Pétales latéraux + sépale dorsal = casque	+ large que long. Nettement trilobé	<b>Filiforme, à extrémité aigüe, arqué vers le bas. 2 x long. ovaire</b>	Espèce très variable selon les nombreux milieux
<i>Gymnadenia densiflora</i>	O. moucheron à infloresc. dense		Toujours humides et surtout calcaires	déb 06 à fin 08	très robuste < 100		<b>Epi floral très dense (+ - 200 fleurs)</b>				Espèce plus rare que <i>G. conopsea</i> , mais souvent à proximité de lui. <b>Floraison plus tardive</b>
<i>Gymnadenia odoratissima</i>	Orchis très odorant	< 1600	Milieux très variés. Surtout alcalin. Pelouses sèches, prairies humides, suintements, marais, bois clairs	déb 06 à fin 08	gracile 10-40	F. étroites, dressées, linéaires. Larg < 10 mm	Epi floral subcylindrique. Fl nombreuses, rose pâle à foncé, saumonées ou blanches		+ long que large. Faiblement trilobé. Lobes latéraux arrondis	Filiforme, à extrémité obtuse, peu arqué. Un peu + court que l'ovaire	Ressemble à <i>G. conopsea</i> , mais en plus grêle. <b>Odeur de vanille prononcée</b>
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Orchis sureau	< 2500	Moy. montagne. Pleine lumière. Pâturages, prairies et bois clairs. Sol calcaire à peu acide.	fin 04 à mi 07	trapue, robuste, fistuleuse 10-30	5-8 F lancéolées à ovales, non maculées. Bractées vertes = ou > aux fleurs moyennes	Epi dense, ovoïde puis sub-cylindrique	S. latéraux étalés à dressés verticalement, réfléchis au sommet. Ovale	trilobé, lobes latéraux + ou - rabattus en arrière. Points et tirets rougeâtres assez fins	Long et épais. Egale ou dépasse l'ovaire. Incurvé vers le bas	<b>Légère odeur de sureau. Coexistence de fleurs rouges et de fl. Jaunes.</b>
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Orchis incarnat	< 2000	Pleine lumière. Sol alcalin ou peu acide. Prairies humides, marais	mi 05 à mi 07	élancée à robuste très creuse 20-70	4 à 7 F non maculées, lancéolées. Les F sup. dressées quasi // à la tige, sommet cucullé, dépasse base de l'inflorescence	Fl petites, svnt roses ou violacé clair (voire blanchâtres)	Labelle avec dessin en boucle entourant réseau de petits points	Entier à faiblement trilobé. Lobes lat. très rabattus en arrière	Épais à la base, conique, incurvé vers le bas (L = 2/3 ovaire)	<b>Bractées longues et larges émergent de l'inflorescence.</b> Voir aussi <i>D. Cruenta</i> (Savoie. SE Isère)
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Orchis de mai	Plaine à < 2000	Pleine lumière. <b>Sols humides à détrempés.</b> Prairies humides. Marais	mi 04 à fin 07	robuste, creuse 20-45	Face supérieure souvent maculée, très étalées, ovales à ov-lancéolées. Bractées dépassent souvent les fleurs.	Epi dense, 10-30 fl. Pourpre-violacé foncé.		Profondément trilobé. Base+claire. Tirets & lignes violet pourpre. Lobes lat. rabattus en arrière	Incurvé vers le bas. Appliqué contre l'ovaire sur 3/4 de sa longueur.	
<i>Dactylorhiza trausteineri</i>	Orchis de Traunsteiner	250 à 2000	Pleine lumière. Prairies humides & suintements. Sols calcaires	déb 06 à fin 07	grêle 15-45 +ou- pleine H.rge-violet	3 à 6 F maculées ou non, étalées à dressées, linéaires (larg < 1,7cm), aiguës, carénées	<b>Epi lâche, peu de fleurs.</b>		Trilobé. Lobes lat. très rabattus en arrière. + clair à la base. Tirets et lignes violet-pourpre foncé	Long = ovaire. > labelle. Conique, droit, croise l'ovaire	
<i>Dactylorhiza elata</i>	Orchis élevé (Comps - Drôme)	700 à 1000	Pleine lumière. Substrat alcalin. Suintement	05 à 06	Elancée 30-80	4 à 8 F. ovales lancéolées ou linéaires lancéolées, svnt non maculées, dressées.	Epi allongé cylindrique à fleurs lâches <b>Bractées sortant de l'épi</b>	Fleurs grandes, roses à pourpre violacé. S. latér. dressés verticalement	+ ou - trilobé, lobes latéraux rabattus en arrière	Long et assez épais	Seule station connue en Rhône-Alpes : Comps (Drôme)
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Orchis tacheté	400 à 2300	Pleine lumière mi-ombre. Pelouses sèches, prairies humides, marais, bois clairs. Calcaire	déb 05 à mi 07	élancée à robuste 25-60	6-9 F généralement maculées. Subdressées à étalées. Inférieures oblongues lancéolées.	Fl assez grandes, pourpre-violacé foncé	S. latéraux étroitement lancéolés étalés à dressés, réfléchis ou rabattus au sommet.	Peu profondément trilobé à subentier. Lobe médian étroit avec tirets & lignes purpurines	Légèrement - long à = ovaire. Assez fin. <b>Incurvé vers le bas,</b> longue l'ovaire.	Tige + ou - lavée de violet vers le sommet
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Orchis de Fuchs	< 2300	Pleine lumière mi-ombre. Pelouses sèches, prairies humides, marais, bois clairs. Sols alcalins.	mi 05 à fin 07	mince, sillonnée, pleine. 25-50	<b>F. courtes et ovales, très étalées</b> souvent très maculées / face sup. gris vert brillant / face inf.			<b>Profondément trilobé, cunéiforme.</b> Lobes lat. écartés, arrondis, tronqués ou falciformes.	<b>Eperon + ou - horizontal.</b>	Ressemble à <i>D. maculata</i> . Différence : feuilles, labelle, éperon.
					<i>Dactylorhiza occitanica</i> Orchis occitan	<i>Idem Dactylorhiza elata</i>	<i>Dactylorhiza Savogensis</i> Orchis de Savoie	<i>Idem Dactylorhiza maculata</i>	<i>Dactylorhiza alpestris</i> Orchis alpestre	<i>Dactylorhiza angustata</i> O. du Dauphiné	<i>Idem Dactylorhiza majalis</i>
<i>Anacamptis pyramidalis</i> subsp <i>pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	< 1500	Pleine lumière mi-ombre. Pelouses, bords de routes. Sols secs, alcalins.	fin 04 à mi 07	Elancée 30-40	4-10 F. Les inférieures dressées, linéaires, lancéolées aiguës. Bractées violacées > ovaire	<b>Epi conique</b> en début de floraison, puis oblong. Fl petites rose à lilas.	S. lat étalés. S. sup et P. en casque lâche.	Labelle en coin, trilobé	Eperon filiforme, grêle, courbé vers le bas.	Voir aussi : <i>A. pyramidalis</i> subsp. <i>tanayensis</i> : Fl. rouge-pourpre + soutenu. F. sup. bractéiformes rouge. Eperon + court
<i>Anacamptis palustris</i>	Orchis des marais	< 1200	Pl lumière. <b>Sols humides à détrempés,</b> + alcalins. Marais, prairies marécageuses, tourbières	fin 05 à fin 06	Cannelée rouge foncé 20-60	F allongées et non maculées, réparties le long de la tige	Fl grandes, assez resserrées, rose magenta. <b>Axe de symétrie oblique</b>		Lobe central à peine + long que lobes latéraux. Centre labelle + clair et tacheté		
<i>Anacamptis laxiflora</i>	Orchis à fleurs lâches	< 1000	Sols humides à détrempés, acides à alcalins. Marais, prairies humides, bords ruisseaux	déb 05 à déb 06	Elancée 30-60	F non maculées fines et allongées	Rouge foncé à violacé. 20 à 40 grandes Fl largement espacées		Fortement plié. Zone centrale blanche. Lobe médian + court que lobes latéraux.		Espèce assez rare
<i>Anacamptis morio</i> subsp <i>morio</i>	Orchis bouffon	< 1400	Pleine lumière. Pelouses, prairies, lisières. Sols secs ou humides, peu acides à basiques.	déb 04 à fin 05	Moyenne 10-30	F. allongées, pliées en gouttière. Non maculées.	5-25 Fl. Moyennes, rouge-violacé +ou- foncé	Casque large, violet. <b>Nettes rayures vertes caractéristiques</b>	Labelle divisé en 3 lobes de longueur égale. Centre + clair et tacheté.	Eperon quasi horizontal.	Voir aussi <i>A. morio</i> subsp. <i>Picta</i> (O. peint).
<i>Anacamptis coriophora</i> subsp <i>coriophora</i>	Orchis punaise	< 1500	Pleine lumière. Prairies de fauche marécageuses, suintements. Sols neutres	déb 05 à fin 06	moyenne 20-40	F. caulinaires petites, engainantes	Bractées membraneuses vert lavé de rouge. L > ovaire. Inflorescence dense. Fl. Grenat à vert olive		Rouge, lavé de vert. Profondément trilobé. Centre + clair et tacheté	Épais, conique, tourné vers le bas	<b>Odeur de punaise des bois.</b> Voir aussi <i>A. coriophora</i> subsp. <i>fragrans</i> , au parfum plus agréable

Nom scientifique	Nom commun	Altitude (m)	Biotope	Fleurit	Tige H = (cm)	Feuilles	Inflorescence	Sépales Pétales	Labelle	Eperon	Observations
<i>Himantoglossum robertianum</i>	Orchis géant	< 750	Pl. lumière à mi-ombre. Terrains secs, calcaires à neutre. Pelouses, garrigues talus	01 à 04	<b>Très robuste</b> 30-90	5 à 8 F en rosette, charnus, vert brillant	Dense, cylindrique. 20-60 grandes FI	Casque verdâtre à rosé	Trilobé rose à violacé, voire verdâtre. L. médian bilobé court. L. lat. <b>ondulés</b> sur les bords extérieurs	Epais, obtu, dirigé vers le bas	
<i>Orchis militaris</i>	Orchis militaire	< 2200	Pleine lumière mi-ombre. Pelouses, prairies, bois clairs. Sols secs, calcaires	fin 04 à fin 07	Robuste 20-45	F. vert brillant. Non tachetées. Entourent la base de la tige.	Inflorescence d'abord dense et conique puis cylindrique. 10-40 FI.	Périanthe en casque : extérieur gris-rose clair, face interne veinée de pourpre	Pendant ou projeté à 45° vers l'avant. Profondément trilobé.	Eperon pâle, 5-7mm. Cylindrique, obtu, descendant. = 1/2 ovaire	<b>Fleur anthropomorphe typique</b>
<i>Orchis simia</i>	Orchis singe	< 1300	Pleine lumière mi-ombre. Pelouses, garrigues, bois clairs. Sols secs, calcaires	déb 04 à déb 07	Elancée 20-45	2-6 F. basales dressées à étalées. F. caulinaires engainantes. Vert blanchâtre, luisantes. Non maculées.	Inflorescence en épi dense et globuleux.	Périanthe en casque : extérieur rose pâle, face interne veinée de pourpre	Profondément trilobé. Extrémités pourpres recourbées vers l'avant	Eperon pâle, 4-8mm. Cylindrique, obtus, descendant. = 1/2 ovaire	<b>Rappelle la silhouette d'un singe</b>
<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpre	< 1800	Pleine lumière mi-ombre. Pelouses, garrigues, bois clairs, chénaies, hêtraies. Sols secs, calc.	déb 04 à déb 07	<b>Robuste</b> 30-80	Vert luisant. Non tachetées	<b>Dense</b>	<b>Casque pourpre foncé</b>	Large, trilobé. Forme variable. Taches poilues pourpre foncé.	Courbé vers le bas long. < ovaire	
<i>Orchis mascula</i>	Orchis mâle	< 2500	Ombre ou pleine lumière. Sol sec à humide. Prairies, alpages, bois clairs.	fin 06 à fin 07	robuste lavée de rouge 20-60	4-8 F. Base étalées à subdressées, oblongues-lancéolées. F. caulinaires + petites, engainantes.	Assez dense 8-20cm. 15-50 fl rouge-pourpre-violacé Peu ou pas d'odeur	S. latéraux ovales dressés vertical. S. dorsal dressé ou en casque avec les P. lat.	Trilobé. Zone claire tachée de pourpre. Lobe médian échancré.	<b>Epais, horizontal à ascendant.</b>	F. basales : non tachées ou taches brun violet larges. Bractée membraneuse rge-pourpre longe l'ovaire
<i>Orchis spitzelii</i>	Orchis de Spitzel	800 à 2000	Espèce strictement montagnarde. Mi-ombre, sol calcaire, sec à frais, bois clairs de conifères.	déb 05 à déb 07	Elancée 20-45 partie sup. rouge foncé	Non tachetées	Inflorescence cylindrique avec des fleurs violettes	<b>Casque vert-olive taché de pourpre à l'int. Face ext. pourpre foncé</b>	Labelle trilobé lilas ponctué de pourpre. Lobes latéraux rabattus.	Dirigé vers le bas. Rose pâle. Large ouverture	Souvent en compagnie du Raisin d'ours
<i>Neotinea ustulata</i> var. <i>ustulata</i>	Orchis brûlé	< 2400	Pelouses, alpages, bois clairs. Sols secs ou humides. Calcaires ou non	fin 04 à mi 07	petite assez robuste 10-30	F. vert-bleu. Non tachetées.	Dense, reconnaissable à son sommet rouge-brun semblable à <b>un tison allumé</b>	Fleurs à casque pourpre	Labelle trilobé, blanchâtre, avec points rouge pourpre. Lobe médian échancré.	Eperon très court.	Orchidée très répandue Voir aussi <i>N. ustulata</i> var. <i>aestivalis</i> Plus grande. Rare
<i>Neotinea tridentata</i>	Orchis tridenté	< 1100	Pleine lumière mi-ombre. Pelouses, talus, lisières ou bois clairs. Sols secs à frais, alcalins.	déb 05 à mi 06	Petite, grêle 15-30	F. vert-bleuté, bordées de violet	Inflorescence globuleuse à petites fleurs rose-violacé.	Casque rayé de pourpre. <b>Labelle trilobé, parsemé de taches roses</b>	Labelle trilobé, parsemé de taches roses	Eperon descendant. Longueur = ovaire	Espèce essentiellement méditerranéenne