

sortie SHNVC du 8 Septembre 2026
4 membres

La RUCHERE en CHARTREUSE - Centre Nordique
38380 SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS
Alt. 1160 m
Gps: 45.408292, 5.795737

validité des binomes vérifiés le même jour sur Index fungorum
Hêtre épicéa sapins (Fagus, Picea, Abies)

TYPE	Genre	espèce	REMARQUES du terrain
BOLETALES	Butyriboletus	appendiculatus	odeur spéciale de la chair du stipe - Réseau jaune sur stipe jaune !!!
	Boletus	edulis	cèpe à marginelle blanche
	Caloboletus	calopus	chapeau blanchâtre – stipe rougeâtre réticulé de jaune
	Chalciporus	piperatus	char jaune vif
	Hygrophoropsis	aurantiaca	lames oranges bifides
	Neoboletus	erythropus	Bolet à pied pointillé de rouge
	Suillellus	luridus	ligne rouge (F Bataille)
	Lactifluus	vellereus	cuticule veloutée
RUSSULA	Russula	amethystina	Un exemplaire à cuticule brune cocardée -
	Russula	badia	espèce très âcre
	Russula	chloroïdes	lames étroites
	Russula	fellea	odeur de compote de pomme
	Russula	rubroalba	cuticle décolorée L1P1 hyphes cuticule 2µm z Romelli L3P3 hyphes 5 µm
	Russula	violacea	gaiac positif L P odeur geranium cuticule rose et vert
SPORES BLANCHES	Collybiopsis	ramealis	stipe noir
	Gymnopus	foetidus	odeur alliagée
	Mycena	pelianthina	arête des lames bordées
	Infundibulicybe	gibba	en entonnoir !
SPORES ROSES	Clitopilus	prunulus	en hêtraie sapinière – cuticule blanche > grise saveur acide et très farineuse !?
	Entocybe	nitida	entolome bleu gris à stipe peu épais
	Laccaria	amethystina	
	Laccaria	laccata	
	Pluteus	salicinus	chapeau gris mais hyphes verdâtres boucles nombreuses cystides à crochet
SPORES BRUNES	Cortinarius	caperatus	pholiote ridée
	Pholiota	flammans	enflammée
	Pyrrhulomyces	astragalinus	abricot
	Kuehneromyces	mutabilis	souche couverte
AUTRES	Calocera	viscosa	en arbuscule jaune vif
	Fomitopsis	pinicola	classique avec sa marge orangée
	Gloeophyllum	odoratum	odeur de pain d'épice – sur souche
	Phellinus	hartigii	sur abies
	Pseudohydnum	gelatinosum	aiguillons transparents et mou



Le bolet appendiculé à un réseau jaune sur stipe jaune
il bleuit


Cuticule + KOH = brun cuivre sinon *B. subbappendiculatus* + KOH = rouge



La fausse girolle est lié à la sciure de bois. Les lames se divisent (fourchues)



Bolet à pied rouge (bon bien cuit) a des points rouges sur stipe jaune et ne doit pas être confondu avec les bolets à réseau rouge



*Russula violacea à une odeur de géranium
et des spores à verrues isolées et L2P2 au Gaïac*

R. cavipes L+NH3= rose

R. pelargonia spores à verrues ± reliées



Russula rubroalba est très proche de *R. romelli* avec un gaiac différent

Mycena pelianthina se reconnaît à l'arête des lames violet foncé



Entocybe nitida un entolome à sporée rose aux belles couleurs bleutées



La pholiote changeante vient en touffe, et possède un bel anneau.
Son stipe est habillé ou guêtré (chaussette)



Calocère visqueuse résiste mal à la sécheresse

Images Eric Michon sauf chapeau de violacea > M. Chemarin †

